

## Title (en)

Process for isomerisation of C5-C8 paraffinic fractions rich in paraffins with more than seven carbon atoms

## Title (de)

Verfahren zur Isomerisierung von C5-C8 paraffinischen Schnitten mit hohem Gehalt an Paraffinen mit mehr als sieben Kohlenstoffatomen

## Title (fr)

Procédé d'isomérisation des coupes paraffiniques C5-C8 riches en paraffines à plus de sept atomes de carbone

## Publication

**EP 0922747 A1 19990616 (FR)**

## Application

**EP 98402869 A 19981119**

## Priority

FR 9714892 A 19971125

## Abstract (en)

[origin: FR2771417A1] Isomerization of C5-C8 paraffin fractions rich in paraffins with more than 7 C atoms is carried out by treating the feed in a reaction zone comprising of a supported catalyst containing at least a halogen and a metal of group VIII, in fix bed, the reaction being carried out between 30-150 deg.C. The totality of the effluent of the first hydroisomerization section passes through the second section. The separation section is based after the hydroisomerization sections, the feed is mixed with the recycled linear paraffins from the separation section and the resulting mix is sent to the first hydroisomerization section. The effluent from the first hydroisomerization section is mixed with the flux rich in mono-branched paraffins from the separation section which is then sent to the second hydroisomerization section and the effluent from that section is then sent to the separation section. The separation section is also located before the hydroisomerization sections, the feed is mixed with the flux resulting from the second hydroisomerization section and the resulting mixture is sent to separation section. The effluent rich in linear paraffins section is sent to the first hydroisomerization section and the flux rich in mono-branched paraffins from the separation section is added to the effluent from the first hydroisomerization section and the resulting mixture is sent to the second hydroisomerization section.

## Abstract (fr)

Procédé d'isomérisation en présence d'hydrogène d'une charge comprenant en majeure partie des paraffines normales contenant de 5 à 8 atomes de carbone par molécule, caractérisé en ce que la somme des teneurs en paraffines normales à 7 et à 8 atomes de carbone par molécule contenues dans la charge est comprise entre 2 et 90 % poids par rapport à la charge, et en ce que ladite charge est traitée dans au moins une zone réactionnelle, contenant au moins un catalyseur en lit fixe, ledit catalyseur comprenant un support, au moins un halogène et au moins un métal du groupe VIII, la réaction étant effectuée à une température comprise entre 30 et 150 °C.

## IPC 1-7

**C10G 45/62**

## IPC 8 full level

**B01J 27/13** (2006.01); **C10G 35/085** (2006.01); **C10G 45/62** (2006.01)

## CPC (source: EP KR US)

**C10G 11/08** (2013.01 - KR); **C10G 11/10** (2013.01 - KR); **C10G 45/62** (2013.01 - EP US); **C10G 2300/1037** (2013.01 - KR)

## Citation (search report)

- [A] EP 0495277 A1 19920722 - UOP INC [US]
- [A] BE 594884 A
- [A] EP 0749780 A2 19961227 - PHILLIPS PETROLEUM CO [US]
- [A] EP 0661095 A1 19950705 - INST FRANCAIS DU PETROLE [FR]
- [A] US 4085067 A 19780418 - POLLITZER ERNEST L, et al
- [A] US 3969425 A 19760713 - HAYES JOHN C

## Designated contracting state (EPC)

DE GB IT NL

## DOCDB simple family (publication)

**FR 2771417 A1 19990528; FR 2771417 B1 19991231**; CA 2252065 A1 19990525; DE 69819286 D1 20031204; DE 69819286 T2 20040513; EP 0922747 A1 19990616; EP 0922747 B1 20031029; JP H11236577 A 19990831; KR 100567996 B1 20060711; KR 19990045556 A 19990625; US 2002002319 A1 20020103; US 2003060673 A1 20030327

## DOCDB simple family (application)

**FR 9714892 A 19971125**; CA 2252065 A 19981124; DE 69819286 T 19981119; EP 98402869 A 19981119; JP 33455898 A 19981125; KR 19980050665 A 19981125; US 19935098 A 19981125; US 28681902 A 20021104